

健 康 チ ェ ッ ク 表

組名前

平 熱	朝	平均値
	午前	
	午後	

必須

月/日 (曜日)	体温			服薬内容	呼吸器 症状	その他の 症状	時間	検印		
	朝	昼	夕							
/1 ()	: °C	: °C	: °C	なし・有	なし・鼻水 咳・鼻閉 喉の痛み	便なし				
						普通便	:			
	症状・通院の記録					軟便・下痢	:			
中耳炎・外耳炎・とびひ・水いぼ 結膜炎・しらみ										
/2 ()	: °C	: °C	: °C	なし・有		便なし				
						普通便	:			
	症状・通院の記録					軟便・下痢	:			
中耳炎・外耳炎・とびひ・水いぼ 結膜炎・しらみ										
/3 ()	: °C	: °C	: °C	なし・有	なし・鼻水 咳・鼻閉 喉の痛み	便なし				
						普通便	:			
	症状・通院の記録					軟便・下痢	:			
中耳炎・外耳炎・とびひ・水いぼ 結膜炎・しらみ										
/4 ()	: °C	: °C	: °C	なし・有	なし・鼻水 咳・鼻閉 喉の痛み	便なし				
						普通便	:			
	症状・通院の記録					軟便・下痢	:			
中耳炎・外耳炎・とびひ・水いぼ 結膜炎・しらみ										
/5 ()	: °C	: °C	: °C	なし・有	なし・鼻水 咳・鼻閉 喉の痛み	便なし				
						普通便	:			
	症状・通院の記録					軟便・下痢	:			
中耳炎・外耳炎・とびひ・水いぼ 結膜炎・しらみ										
/6 ()	: °C	: °C	: °C	なし・有	なし・鼻水 咳・鼻閉 喉の痛み	便なし				
						普通便	:			
	症状・通院の記録					軟便・下痢	:			
中耳炎・外耳炎・とびひ・水いぼ 結膜炎・しらみ										
/7 ()	: °C	: °C	: °C	なし・有	なし・鼻水 咳・鼻閉 喉の痛み	便なし				
						普通便	:			
	症状・通院の記録					軟便・下痢	:			
中耳炎・外耳炎・とびひ・水いぼ 結膜炎・しらみ										
/8 ()	: °C	: °C	: °C	なし・有	なし・鼻水 咳・鼻閉 喉の痛み	便なし				
						普通便	:			
	症状・通院の記録					軟便・下痢	:			
中耳炎・外耳炎・とびひ・水いぼ 結膜炎・しらみ										

※日中に検温等を実施し、体調不良児の早期発見に努めます。なお、体調不良の際は早めに連絡をさせて頂きます。

※登園時いつも様子が違うと感じる時は「健康チェックカード」提出の際職員に口頭でお伝えください。

※お子様や家族に発熱や呼吸器症状が確認された場合は、園へ連絡のうえ登園を見合わせるようお願いいたします。解熱後24時間以上が経過し、呼吸器症状の改善がみられるまでは自宅等で療養してください。

※不要不急な外出を控えるとともに、感染リスクの高い「密閉・密集・密接」する場所への出入りを避けてください。

健 康 チ エ ッ ク 表			
組 名前			

平 熱	朝 午前 午後	平均値
--------	---------------	-----

必須

月/日 (曜日)	体温			服薬内容	呼吸器 症状	その他の 症状	時間	検印
	朝	昼	夕					
/9 ()	: °C	: °C	: °C	なし・有	なし・鼻水 咳・鼻閉 喉の痛み	便なし 普通便 軟便・下痢 中耳炎・外耳炎・とびひ・水いぼ 結膜炎・しらみ		
	症状・通院の記録				家族の発熱や呼吸器症状、学校、職場等の様子 その他の記録			
/10 ()	: °C	: °C	: °C	なし・有	なし・鼻水 咳・鼻閉 喉の痛み	便なし 普通便 軟便・下痢 中耳炎・外耳炎・とびひ・水いぼ 結膜炎・しらみ		
	症状・通院の記録				家族の発熱や呼吸器症状、学校、職場等の様子 その他の記録			
/11 ()	: °C	: °C	: °C	なし・有	なし・鼻水 咳・鼻閉 喉の痛み	便なし 普通便 軟便・下痢 中耳炎・外耳炎・とびひ・水いぼ 結膜炎・しらみ		
	症状・通院の記録				家族の発熱や呼吸器症状、学校、職場等の様子 その他の記録			
/12 ()	: °C	: °C	: °C	なし・有	なし・鼻水 咳・鼻閉 喉の痛み	便なし 普通便 軟便・下痢 中耳炎・外耳炎・とびひ・水いぼ 結膜炎・しらみ		
	症状・通院の記録				家族の発熱や呼吸器症状、学校、職場等の様子 その他の記録			
/13 ()	: °C	: °C	: °C	なし・有	なし・鼻水 咳・鼻閉 喉の痛み	便なし 普通便 軟便・下痢 中耳炎・外耳炎・とびひ・水いぼ 結膜炎・しらみ		
	症状・通院の記録				家族の発熱や呼吸器症状、学校、職場等の様子 その他の記録			
/14 ()	: °C	: °C	: °C	なし・有	なし・鼻水 咳・鼻閉 喉の痛み	便なし 普通便 軟便・下痢 中耳炎・外耳炎・とびひ・水いぼ 結膜炎・しらみ		
	症状・通院の記録				家族の発熱や呼吸器症状、学校、職場等の様子 その他の記録			
/15 ()	: °C	: °C	: °C	なし・有	なし・鼻水 咳・鼻閉 喉の痛み	便なし 普通便 軟便・下痢 中耳炎・外耳炎・とびひ・水いぼ 結膜炎・しらみ		
	症状・通院の記録				家族の発熱や呼吸器症状、学校、職場等の様子 その他の記録			
/16 ()	: °C	: °C	: °C	なし・有	なし・鼻水 咳・鼻閉 喉の痛み	便なし 普通便 軟便・下痢 中耳炎・外耳炎・とびひ・水いぼ 結膜炎・しらみ		
	症状・通院の記録				家族の発熱や呼吸器症状、学校、職場等の様子 その他の記録			

※日中に検温等を実施し、体調不良児の早期発見に努めます。なお、体調不良の際は早めに連絡をさせて頂きます。

※登園時いつもと様子が違うと感じる時は「健康チェックカード」提出の際職員に口頭でお伝えください。

※お子様や家族に発熱や呼吸器症状が確認された場合は、園へ連絡のうえ登園を見合せようお願いいいたします。解熱後24時間以上が経過し、呼吸器症状の改善がみられるまでは自宅等で療養してください。

※不要不急な外出を控えるとともに、感染リスクの高い「密閉・密集・密接」する場所への出入りを避けてください。

健 康 チ ェ ッ ク 表

組名前

平 熱	朝	平均値
	午前	
	午後	

必須

月/日 (曜日)	体温			服薬内容	呼吸器 症状	その他の 症状	時間	検印
	朝	昼	夕					
/17 ()	: °C	: °C	: °C	なし・有	なし・鼻水 咳・鼻閉 喉の痛み	便なし 普通便 軟便・下痢 中耳炎・外耳炎・とびひ・水いぼ 結膜炎・しらみ		
	症状・通院の 記録			家族の発熱や呼吸器症状、学校、職場等の様子 その他の記録				
/18 ()	: °C	: °C	: °C	なし・有	なし・鼻水 咳・鼻閉 喉の痛み	便なし 普通便 軟便・下痢 中耳炎・外耳炎・とびひ・水いぼ 結膜炎・しらみ		
	症状・通院の 記録			家族の発熱や呼吸器症状、学校、職場等の様子 その他の記録				
/19 ()	: °C	: °C	: °C	なし・有	なし・鼻水 咳・鼻閉 喉の痛み	便なし 普通便 軟便・下痢 中耳炎・外耳炎・とびひ・水いぼ 結膜炎・しらみ		
	症状・通院の 記録			家族の発熱や呼吸器症状、学校、職場等の様子 その他の記録				
/20 ()	: °C	: °C	: °C	なし・有	なし・鼻水 咳・鼻閉 喉の痛み	便なし 普通便 軟便・下痢 中耳炎・外耳炎・とびひ・水いぼ 結膜炎・しらみ		
	症状・通院の 記録			家族の発熱や呼吸器症状、学校、職場等の様子 その他の記録				
/21 ()	: °C	: °C	: °C	なし・有	なし・鼻水 咳・鼻閉 喉の痛み	便なし 普通便 軟便・下痢 中耳炎・外耳炎・とびひ・水いぼ 結膜炎・しらみ		
	症状・通院の 記録			家族の発熱や呼吸器症状、学校、職場等の様子 その他の記録				
/22 ()	: °C	: °C	: °C	なし・有	なし・鼻水 咳・鼻閉 喉の痛み	便なし 普通便 軟便・下痢 中耳炎・外耳炎・とびひ・水いぼ 結膜炎・しらみ		
	症状・通院の 記録			家族の発熱や呼吸器症状、学校、職場等の様子 その他の記録				
/23 ()	: °C	: °C	: °C	なし・有	なし・鼻水 咳・鼻閉 喉の痛み	便なし 普通便 軟便・下痢 中耳炎・外耳炎・とびひ・水いぼ 結膜炎・しらみ		
	症状・通院の 記録			家族の発熱や呼吸器症状、学校、職場等の様子 その他の記録				
/24 ()	: °C	: °C	: °C	なし・有	なし・鼻水 咳・鼻閉 喉の痛み	便なし 普通便 軟便・下痢 中耳炎・外耳炎・とびひ・水いぼ 結膜炎・しらみ		
	症状・通院の 記録			家族の発熱や呼吸器症状、学校、職場等の様子 その他の記録				

※日中に検温等を実施し、体調不良児の早期発見に努めます。なお、体調不良の際は早めに連絡をさせて頂きます。

※登園時いつもと様子が違うと感じる時は「健康チェックカード」提出の際職員に口頭でお伝えください。

※お子様や家族に発熱や呼吸器症状が確認された場合は、園へ連絡のうえ登園を見合せようお願いいたします。解熱後24時間以上が経過し、呼吸器症状の改善がみられるまでは自宅等で療養してください。

※不要不急な外出を控えるとともに、感染リスクの高い「密閉・密集・密接」する場所への出入りを避けてください。

健 康 チ エ ッ ク 表

平 熱	朝	平均値
	午前	
	午後	

必須

組名前

月/日 (曜日)	体温			服薬内容	呼吸器 症状	その他の 症状	時間	検印
	朝	昼	夕					
/25 ()	: °C	: °C	: °C	なし・有	なし・鼻水 咳・鼻閉 喉の痛み	便なし 普通便 軟便・下痢		
	症状・通院の 記録					中耳炎・外耳炎・とびひ・水いぼ 結膜炎・しらみ		
/26 ()	: °C	: °C	: °C	なし・有	なし・鼻水 咳・鼻閉 喉の痛み	便なし 普通便 軟便・下痢		
	症状・通院の 記録					中耳炎・外耳炎・とびひ・水いぼ 結膜炎・しらみ		
/27 ()	: °C	: °C	: °C	なし・有	なし・鼻水 咳・鼻閉 喉の痛み	便なし 普通便 軟便・下痢		
	症状・通院の 記録					中耳炎・外耳炎・とびひ・水いぼ 結膜炎・しらみ		
/28 ()	: °C	: °C	: °C	なし・有	なし・鼻水 咳・鼻閉 喉の痛み	便なし 普通便 軟便・下痢		
	症状・通院の 記録					中耳炎・外耳炎・とびひ・水いぼ 結膜炎・しらみ		
/29 ()	: °C	: °C	: °C	なし・有	なし・鼻水 咳・鼻閉 喉の痛み	便なし 普通便 軟便・下痢		
	症状・通院の 記録					中耳炎・外耳炎・とびひ・水いぼ 結膜炎・しらみ		
/30 ()	: °C	: °C	: °C	なし・有	なし・鼻水 咳・鼻閉 喉の痛み	便なし 普通便 軟便・下痢		
	症状・通院の 記録					中耳炎・外耳炎・とびひ・水いぼ 結膜炎・しらみ		
/31 ()	: °C	: °C	: °C	なし・有	なし・鼻水 咳・鼻閉 喉の痛み	便なし 普通便 軟便・下痢		
	症状・通院の 記録					中耳炎・外耳炎・とびひ・水いぼ 結膜炎・しらみ		

※日中に検温等を実施し、体調不良児の早期発見に努めます。なお、体調不良の際は早めに連絡をさせて頂きます。

※登園時いつも様子が違うと感じる時は「健康チェックカード」提出の際職員に口頭でお伝えください。

※お子様や家族に発熱や呼吸器症状が確認された場合は、園へ連絡のうえ登園を見合わせるようお願いいたします。解熱後24時間以上が経過し、呼吸器症状の改善がみられるまでは自宅等で療養してください。

※不要不急な外出を控えるとともに、感染リスクの高い「密閉・密集・密接」する場所への出入りを避けてください。